

LE STAZIONI IN DETTAGLIO

Stazione: PASSO DEL BROCON



Inquadramento geografico

Località: Passo del Brocon
Comune: Cinte Tesino
Provincia: Trento
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi orientali
Coordinate geografiche: 46° 07' N; 11° 41' E
Valle e/o gruppo montuoso: Cima d'Asta

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico
Quota dell'impianto di cattura: 1714 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Nord Ovest - Sud Est
Quota massima del sistema montuoso: 2058 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Nord Ovest - Sud Est

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia alpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte subalpino a prateria e abete rosso
Vegetazione nei pressi delle reti: Ambiente sommitale in prevalenza a prateria e secondariamente a pecceta e boschi misti a larice e faggio, con vegetazione alta più di 10 m in parte sottoposta a regolazione, con frutti di ginepro, sorbo, ontano verde e ribes

Caratteristiche impianto

Tipologia: Passata
Mettratura reti: 120 m (pentadi 47, 48, 49, 50); 420 m (pentadi 54, 55, 56, 57, 58)

Periodo attività

Attività progressa: Svolta saltuariamente negli autanni 1997 e 1998, regolarmente ogni pentade da metà agosto a metà settembre e in modo continuativo in ottobre 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003
Attività nel 2004: Svolta in modo continuativo da metà agosto ai primi di settembre e da fine settembre a metà ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 47 (3 giorni); 48 (prior., 3 giorni); pentade 49 (4 giorni); pentade 50 (3 giorni); pentade 54 (2 giorni); pentade 55 (prior., 5 giorni); pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 3 giorni); pentade 58 (2 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Stefano Noselli (R); Paolo Pedrini (R); Francesca Rossi (R); Giancarlo Battaglia; Antonella Bini; Elisabetta Chierici; Lorenzo Cogo; Mauro Del Sere; Riccardo Gambogi; Paolo Giacchini; Dimitri Giunchi; Alessandro Micheli; Oscar Niederfriniger; Enrica Pollonara; Sandro Sacchetti; Domenico Vassallo; Marco Zenatello
C: Roberto Barezzi; Igor Bezzati; Andrea Buffa; Marco Cabassa; Francesco Ceresa; Felicità Ciavaglia; Lorena Cogo; Valentina Di Stefano; Marlis Focher; Benedetto Franceschini; Giuliana Gambogi; Simona Laficara; Roberto Maistri; Marco Obletter; Matteo Pegoretti; Francesco Piccio, Francesco Pino; Giuliano Pivarò; Paolo Porta; Davide Righetti; Isabella Sacchetti; Giovanni Zampieri; Staz. For. di Pieve Tesino e Canal S. Bovo; Comune di Cinte Tesino e di Castello Tesino; Ass. Cacciatori di Castello Tesino e Cinte Tesino; Il Personale delle Stazioni Forestali che ha partecipato al corso di aggiornamento

Brocon 2004

ALPI ORIENTALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	47	48	49	50	54	55	56	57	58	totale
		(3)	(3)	(4)	(3)	(2)	(5)	(5)	(3)	(2)	
		Prior.					Prior.	Prior.	Prior.		
Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)								1			1
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)					1		1	2			4
Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)							1	1			2
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)				1			1				2
Civetta nana (<i>Glaucidium passerinum</i>)		1	1				2		1		5
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)		1					1	1	1		4
Civetta capogrosso (<i>Aegolius funereus</i>)					1	2	1	3	1		8
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)		1									1
Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>)							1				1
Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)								1			1
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)		1	3								4
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		8	8	37	16	1	1				71
Pispola (<i>Anthus pratensis</i>)								5	23	3	31
Spioncello (<i>Anthus spinoletta</i>)				1	1	1	59	25	11	6	104
Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)			1								1
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)									1		1
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)						1	4	6	7		18
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)		2	1		1	4	11	13	6		38
Pettiorosso (<i>Erithacus rubecula</i>)		4	10	9	25	18	339	321	98	6	830
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)				3			6	2	1		12
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		4	4	5	11	2	12	13	5		56
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)		1		14	13		1				29
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)			2	2	2	4	7	5	5		27
Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)						2	1				3
Merlo (<i>Turdus merula</i>)							9	11	1	1	22
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)				1		8	25	13	5	4	56
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)								1			1
Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>)							3	4			7
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)								1			1
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)				1							1
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)			6	1	5						12
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)			1		2						3
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		1		3	2		1				7
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)				1							1
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		2	3	8	2		6	6	8		35
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		2	6	21	11		3		1		44
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)		3	2	6	3	4	15	23	11	6	73
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)			1	2	2						5
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)					1						1
Balia dal collare (<i>Ficedula albicollis</i>)					1						1
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		6	32	143	35						216
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		5	6	9	14	3	12	16	8	5	78
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)										1	1
Cincia dal ciuffo (<i>Parus cristatus</i>)				1				2		1	4
Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>)		1	1	3				1	2		8
Rampichino alpestre (<i>Certhia familiaris</i>)		1		1			2				4
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)						1	2	2		1	6
Nocciolaia (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)			3	1		1	4	1			10
Sturno (<i>Sturnus vulgaris</i>)									3		3
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)				1			19	178	194	35	427
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)								2	6	1	9
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)				1							1
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)							1	1	1		3
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)			1	5	37	10	38	113	22	9	235
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)				1	2		1				4
Organetto (<i>Carduelis flammea</i>)										3	3
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)		2	4	4			8	33	46	8	105
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)			11			1					12
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)							1	24	61		86
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)		1									1
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)									1		1
totale esemplari		47	107	286	188	63	599	831	530	90	2741
totale specie		19	21	28	22	16	34	32	27	15	61

Stazione: VAJO GALINA



Inquadramento geografico

Località: Fondo "Sponde"
Comune: Verona
Provincia: Verona
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi Centrali
Coordinate geografiche: 45° 29' N; 10° 59' E
Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi Venete

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Versante
Quota dell'impianto di cattura: 285 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Nord - Sud
Quota massima del sistema montuoso: 1865 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Nord - Sud

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Vegetazione nei pressi delle reti: Prati incolti a *xerobrometum* periodicamente sfalciati
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare a prateria di tipo xerico con siepi parallele, alte da 0,5 a 4 m e distanti mediamente 3-4 m, la cui composizione floristica è la seguente: *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Fraxinus ornus*, *Cornus sanguinea*, *Cotinus coggygria*, *Paliurus spina-christi*, *Juniperus communis*, *Rubus spp.*, *Rosa spp.*, *Quercus pubescens*, *Ulmus minor*, *Acer campestre* ecc.

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti
Metrazione reti: 108 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta saltuariamente a partire dall' inverno 1998-1999, in modo regolare in agosto-ottobre dal 2000 al 2002, saltuariamente nel 2003
Attività nel 2004: Svolta abbastanza regolarmente ogni decade da agosto ai primi di ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 5 giorni); pentade 46 (prior., 5 giorni); pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 52 (prior., 4 giorni); pentade 57 (prior., 5 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Riccardo Bombieri (R); Roberto Pollo
C: Giorgio Rubele

Vajo Galina 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	43	46	48	52	57	totale
		(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(24)
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)						1	1
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		2		1	3	8	14
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)					1	3	4
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		1	1			1	3
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)			1	1			2
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)			1				1
Occhiocotto (<i>Sylvia melanocephala</i>)				1			1
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)			3	5	15		23
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		5	1	1	16	21	44
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)				1	1		2
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)			1	1	2	24	28
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)					2		2
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)						1	1
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)					1	1	2
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)					1		1
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)		1				2	3
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)		1	3	3	1	2	10
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)		1	1			1	3
totale esemplari		11	12	14	43	65	145
totale specie		6	8	8	10	11	18

Stazione: BOCCA DI CASET



Inquadramento geografico

Località: Tremalzo
Comune: Molina di Ledro-Tiarno di sotto
Provincia: Trento
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali
Coordinate geografiche: 45° 51' N; 10° 41' E
Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi Ledrensi

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico
Quota dell'impianto di cattura: 1608 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Nord Ovest - Sud Est
Quota massima del sistema montuoso: 1954 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Nord Est - Sud Ovest

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte montano a faggio, abete rosso e larice
Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco misto a faggio e abete rosso secondariamente associati a larice e abete bianco, con vegetazione alta da 5 a 10 m e sottoposta a regolazione annuale, pochi frutti di ginepro e sorbo

Caratteristiche impianto

Tipologia: Passata
Mettratura reti: 396 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta saltuariamente da agosto a novembre dal 1993, in modo regolare o continuativo da metà agosto a ottobre dal 2001
Attività nel 2004: Svolta in maniera continuativa da settembre a metà ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): pentade 51 (5 giorni); pentade 52 (prior., 4 giorni); pentade 53 (5 giorni); pentade 54 (5 giorni); pentade 55 (prior., 5 giorni); pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 4 giorni); pentade 58 (4 giorni); pentade 59 (prior. 4 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Paolo Pedrini (R); Lucio Bordignon; Alessandro Micheli; Marco Morbioli; Maurizio Paladin; Mario Rizzardini; Franco Rizzolli; Leo Rocco; Fernando Spina; Claudio Tomasi; Gilberto Volcan
C: Roberto Barezzani; Gianni Baruzzi; Alberto Bertocchi; Daniele Bonisoli; Marco Cabassa; Giuliano Caliani; Alex Caliani; Stefania Capelli; Nicola Carraro; Francesco Ceresa; Paola Costantini; Andrea Cristelloni; Davide Dalpiaz; Karol Tabarelli De Fatis; Maria Chiara Deflorian; Alessandro Devigili; Paolo Ferretti; Alessandro Franzoi; Livia Giovannini; Gianfranco Malacarne; Luigi Marchesi; Enzo Masella; Alessandra Pallaveri; Matteo Pegoretti; Michele Pisetta; Enrico Romanazzi; Mauro Saetti; Alessia Scalfi; Giacomo Segata; Michele Segata; Stefano Sirotti; Annarosa Spina; Alessandro Tenca; Emiliano Tomasi; Rachele Tomasi; Liana Trentin; Lucio Uber; Giacomo Villa; Elena Zamprogno
Personale Stazione Forestale di Tiarno di Sotto e Riva del Garda; i proprietari dell'edificio
Il Personale delle Stazioni Forestali che ha partecipato al corso di aggiornamento

Bocca di Caset 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	totale
		(5)	(5) Prior.	(4)	(5)	(5) Prior.	(5) Prior.	(4) Prior.	(4) Fac.	(5) Prior.	(42)
Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)								1			1
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)		4					1	1	1	1	8
Francolino di monte (<i>Bonasia bonasia</i>)						1					1
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)						1	1				2
Assiolo (<i>Otus scops</i>)		1									1
Civetta nana (<i>Glaucidium passerinum</i>)							1				1
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)		2									2
Civetta capogrosso (<i>Aegolius funereus</i>)		1	3	4	2			2			12
Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>)				1		1					2
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)			1								1
Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>)		2		3		1					6
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		5		1		1	1				8
Pispola (<i>Anthus pratensis</i>)							1		1		2
Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)					4						4
Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>)						1				1	2
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)		1	2	3	4	2	8	3	1	2	26
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)		6	4	7	3	8	9	1	1	2	41
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		100	61	238	98	329	194	77	27	73	1197
Codiroso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochrurus</i>)			1	1	1	2	2		2	5	14
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		4	3	9	3	2	3				24
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)		3		2		1					6
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)		1	1	3	1	3		1		1	11
Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)			1	2	3	1	2	2			11
Merlo (<i>Turdus merula</i>)				1	1	2	9	2	3	4	22
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)									5		5
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)		5	5	21	10	31	44	19	4	9	148
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)										1	1
Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>)		1			2	1	3	2	3	3	15
Cannaiola (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)			1								1
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)		1									1
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)						1					1
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)		1		1							2
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		5	2								7
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		4		1		4					9
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)		1									1
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		7	13	6	7	11	17	7	8		76
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		35	6	2	2	6	1				52
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)		7	5	16	6	14	15	5	12	25	105
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)		10	4	1	3	5	5	1		1	30
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)		2									2
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		24	21	6	1	1	2	1			56
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)		2	2						2	11	17
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		14	18	9	10	10	7	3	9	4	84
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)		1			1				1		3
Cincia dal ciuffo (<i>Parus cristatus</i>)		4				3	2	1	1	1	12
Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>)		10	1	1					1		13
Rampichino alpestre (<i>Certhia familiaris</i>)		2	3	1	3	1	2				12
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)							3		1		4
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)		5	2	2		104	878	438	148	304	1881
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)						1	20	34	15	45	115
Venturone (<i>Serinus citrinella</i>)									3		3
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)						1	1	1	2		5
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)		47	67	181	79	356	777	466	221	839	3033
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)					1			3	1	1	6
Crociera (<i>Loxia curvirostra</i>)		43	14	52	32	6	12	29	20	44	252
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		18	6	2	2				1		29
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)							10	41	10	153	214
Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)		1									1
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)							1				1
totale esemplari		380	247	577	279	912	2032	1141	504	1530	7602
totale specie		36	25	28	24	32	30	24	27	22	59

Stazione: A. DUSE-PASSO DI SPINO



Inquadramento geografico

Località: Passo di Spino
Comune: Toscolano Maderno
Provincia: Brescia
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali
Coordinate geografiche: 45° 41' N; 10° 34' E
Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi bresciane

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico
Quota dell'impianto di cattura: 1180 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Nord Est-Sud Ovest
Quota massima del sistema montuoso: 1582 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Il massiccio montuoso delle "Giudicarie Bresciane" è movimentato e complesso con orientamento prevalente Nord-Sud

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Piano montano, caratterizzato da boschi di latifoglie miste e in particolare dal faggio
Vegetazione nei pressi delle reti: Faggeto-carpineto con dominanza di carpino nero, acero montano, olmo montano e faggio. In particolare il crinale è affiancato da due filari di faggi secolari

Caratteristiche impianto

Tipologia: Passata
Metatura reti: 270 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta in maniera regolare ogni pentade in autunno 2000 e in modo continuativo in agosto, settembre e ottobre 2001, 2002 e 2003
Attività nel 2004: Svolta in modo continuativo in agosto, settembre e ottobre

Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 47 (5 giorni); pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 49 (5 giorni); pentade 50 (5 giorni); pentade 51 (5 giorni); pentade 52 (prior., 5 giorni); pentade 53 (5 giorni); pentade 54 (5 giorni); pentade 55 (prior., 5 giorni); pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 5 giorni); pentade 58 (5 giorni); pentade 59 (prior., 4 giorni); pentade 60 (4 giorni); pentade 61 (3 giorni)

Responsabile, inanellatore/i e collaboratori

I: Lorenzo Fornasari (R); Paolo Bonazzi; Sergio Fasano; Maria Elena Ferrari; Andrea Galimberti; Marco Gustin; Ariele Magnani; Francesco Oranghi; Danilo Pisu; Massimo Sacchi; Massimo Salvarani; Jacopo Tonetti
C: Gianpiero Calvi; Matteo Capra; Elena Comi; Elisabetta de Carli; Alessio Farioli; Umberto Gandolfi; Daniele Iannuzzo; Daniele Iavicoli; Gabriele Mercurielli; Fabrizio Orsini; Flavia Rossi; Elisa Vallinotto

Passo di Spino 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	totale (71)
		(5) Prior.	(5) Prior.	(5)	(5)	(5) Prior.	(5) Prior.	(5)	(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(4) Prior.	(4)	(3)	
Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)				1													1
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)														1			1
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)		1								2				1			4
Colombella (<i>Columba oenas</i>)													1				1
Assiolo (<i>Otus scops</i>)				1				1									2
Civetta (<i>Athene noctua</i>)					1												1
Allocco (<i>Strix aluco</i>)				1													1
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)							1	1						1			3
Civetta capogrosso (<i>Aegolius funereus</i>)								1	3								4
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)		1		4					1								6
Picchio cenerino (<i>Picus canus</i>)									1								1
Rondine montana (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)													1	1			2
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)			1	2	5												8
Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>)		4	6	4	69	1	3										87
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		1	2		2	3						1					9
Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)						1		1	5								7
Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>)							1	1									2
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)													3				3
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)							1	1	2		2	8	6	8	19	1	48
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)													2	1			3
Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)		9	3	8	4	14	9	27	24	54	33	29	51	55	119	4	443
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)						1											1
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)								1					3	1	17	3	25
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		1	2	1	2	3		2	2	1	3						17
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)				3	3					1							7
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)			1														1
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)				1			1		7		2						11
Merlo (<i>Turdus merula</i>)											1			1	3	1	6
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)					3			1		9	7	3	7	5	6	1	42
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)															1		1
Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>)				1						2			1	1	1		6
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)							1										1
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)		1															1
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)										1							1
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		1		2	3	1		1		3							11
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		2				2		1	1	3							9
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)			2														2
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)			1														1
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)				1						1		3	3	2	1		11
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)			3	2	2	1		1		1							10
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)											1		8	6	69	5	89
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)								2					1		1		4
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		9	28	50	52	10	1	3		1	1						155
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)							1		1	2				6			10
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)							1	1	1	1	1		1		1	2	9
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)			1				1			1	1			2			6
Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>)		1	1	1	1		1			2	1	1					9
Rampichino alpestre (<i>Certhia familiaris</i>)													2				2
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)		1															1
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)										16	106	137	103	136	52	88	638
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)											2	2	16	5	10	10	45
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)																2	2
Venturone (<i>Serinus citrinella</i>)													1				1
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)													3				3
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)						5	8	4		32	72	123	147	187	114	122	814
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)										2	1				3	3	9
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)										2		6	3				11
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)																1	1
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)											2		9	12	62	19	104
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)			1						1			1		1			4
totale esemplari		32	52	83	147	42	30	50	49	137	237	313	372	433	479	262	2718
totale specie		12	13	16	12	11	13	17	12	20	17	10	21	20	16	14	60

Stazione: PASSO DELLA BERGA



Inquadramento geografico

Località: Passo della Berga
Comune: Bagolino e Lavenone
Provincia: Brescia
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali
Coordinate geografiche: 45° 47' N; 10° 25' E
Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi bresciane

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico
Quota dell'impianto di cattura: 1517 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Nord Ovest - Sud Est
Quota massima del sistema montuoso: 2064 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Nord Est - Sud Ovest

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte montano con faggio e pino mugo
Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco misto a faggio e pino mugo con vegetazione, alta da 1 a 4 m, sottoposta a regolazione annuale, assenza di frutti

Caratteristiche impianto

Tipologia: Passata
Metratura reti: 272 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta saltuariamente in autunno dal 1994; regolarmente ogni decade in ottobre dal 1998 al 2000, saltuariamente in agosto 2000 e regolarmente in agosto, settembre e ottobre 2001, 2002 e settembre, ottobre 2003
Attività nel 2004: Svolta saltuariamente in agosto, settembre e ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 48 (prior., 2 giorni); pentade 49 (2 giorni); pentade 52 (prior., 3 giorni); pentade 53 (1 giorno); pentade 57 (prior., 5 giorni); pentade 58 (2 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Roberto Bertoli (R); Rocco Leo (R); Mario Rizzardini (R); Marilena Perbellini (R)
C: Silvia Baldo; Silvano Bellomi; Ermanno Bollin; Sofia Bonato; Davide Camini; Stefania Capelli; Marina Carletti; Laura Cianfanelli; Beppe De Marchi; Paola Fusi; Gargioni; Paolo Ghidinelli; Francesco Lamberti; Germana Lamberti; Cristina Nencini; Angelo Pasqua; Gabriele Piotti; Mario Perbellini; Fulvio Zanardini

Passo della Berga 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade	48	49	52	53	57	58	totale
	(giornate di attività)	(2) Prior.	(2)	(3) Prior.	(1)	(5) Prior.	(2)	(15)
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)				1				1
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)						1		1
Assiolo (<i>Otus scops</i>)		1						1
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)			1					1
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)			1					1
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		1	1		1			3
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)						23	3	26
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)		1		2		3	2	8
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		9	5	17	22	172	7	232
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)			1					1
Codiroso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)		1						1
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		1	2	1	2	3		9
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)			1					1
Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)				2				2
Merlo (<i>Turdus merula</i>)				2		2	1	5
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)			1	1	1	15	2	20
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)		1		1				2
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)					2			2
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		1	1					2
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)		1						1
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		4	3	1	2	19	8	37
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		4	27	1				32
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)			1	3	3	18	17	42
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)				2	4	13	2	21
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		9	64	1				74
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)							1	1
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		11	3	6	4	4	8	36
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)							30	30
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)		1						1
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)			1	1		552	90	644
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)						16	3	19
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)				1				1
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)				28	12	110	14	164
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)		1		2		2		5
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		1		1				2
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)						35		35
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)				1	1			2
totale esemplari		48	113	75	54	988	188	1466
totale specie		16	15	20	11	16	14	37

Stazione: GIOGO DEL MANIVA



Inquadramento geografico

Località: Giogo del Maniva
Comune: Collio V.T. - Bagolino
Provincia: Brescia
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi Centrali
Coordinate geografiche: 45° 49' N; 10° 24' E
Valle e/o gruppo montuoso: Valle Trompia, Dosso Alto

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico
Quota dell'impianto di cattura: 1664 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Est - Ovest
Quota massima del sistema montuoso: 2064 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Est - Ovest

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia albina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte subalpino con ontano verde, pino mugo, abete rosso, sorbo e faggio
Vegetazione nei pressi delle reti: Pascolo, con cespugli di ontano verde, pino mugo fino a 1 m

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti
Mettratura reti: 170 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta in maniera continuativa in ottobre dall'anno 2000
Attività nel 2004: Svolta in maniera continuativa nel mese di ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 55 (prior., 4 giorni); Pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 5 giorni); pentade 58 (5 giorni); pentade 59 (prior., 5 giorni); pentade 60 (5 giorni); pentade 61 (3 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Ermanno Borghesi (R)
C: Giuseppe Bregoli; Eliodoro Gerardini

Giogo del Maniva 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	55	56	57	58	59	60	61	totale
		(4) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(5)	(5) Prior.	(5)	(3)	(32)
Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>)							1		1
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)							1		1
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		1							1
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)		1	2	3	2	1	3		12
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)		11	13	4	6	8	7	1	50
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		232	255	224	46	29	52	2	840
Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)			1						1
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)			1		2		4		7
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		1	1	1			1		4
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)			1						1
Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)			1		1				2
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		1	2	2	1	8	10	1	25
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)					1				1
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)		11	24	6	10	2	9		62
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)							2	2	4
Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>)						1			1
Beccamoschino (<i>Cisticola juncidis</i>)			1						1
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)		1							1
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)			2						2
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)			2	4	1				7
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		8	41	29	2		3		83
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		4	1						5
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)		13	21	49	43	49	217	16	408
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)		1	3	4	3	5	7		23
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)			1						1
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)						4			4
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		6	3	2	4		11	3	29
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)						1			1
Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>)		1							1
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)		14	181	103	47	62	51		458
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)			3	3	2	6	33	9	56
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)			1		1				2
Venturone (<i>Serinus citrinella</i>)							1	1	2
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)		18	64	191	27	39	46	5	390
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)					1				1
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)			1	4					5
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)			10		4	4	10		28
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)							1		1
totale esemplari		324	636	629	204	219	470	40	2522
totale specie		16	25	15	19	14	20	9	38

Stazione: CAMPIANI PEDRINA



Inquadramento geografico	<p>Località: Campiani Pedrina</p> <p>Comune: Gussago</p> <p>Provincia: Brescia</p> <p>Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali</p> <p>Coordinate geografiche: 45° 36' N; 10° 11' E</p> <p>Valle e/o gruppo montuoso:</p>
Orografia e caratteristiche del sito	<p>Tipologia del sito: Piccolo valico collinare</p> <p>Quota dell'impianto di cattura: 260 m s.l.m.</p> <p>Orientamento dell'impianto di cattura: Nord - Sud</p> <p>Quota massima del sistema montuoso: 375 m</p> <p>Orientamento del sistema montuoso: Nord - Sud</p>
Caratteristiche ambientali	<p>Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina</p> <p>Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare con carpino nero, roverella e robinia</p> <p>Vegetazione nei pressi delle reti: Vite, Olivo e prato</p>
Caratteristiche impianto	<p>Tipologia: Impianto fisso</p> <p>Metratura reti: 160 m</p>
Periodo attività	<p>Attività pregressa: Svolta in modo continuativo nel 2000, come "Roccolo Campiani", nel 2001 2002 e 2003 da metà agosto a metà settembre</p> <p>Attività nel 2004: Svolta in modo continuativo dal 30 luglio a metà settembre</p> <p>Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 5 giorni); pentade 44 (5 giorni); pentade 45 (5 giorni); pentade 46 (prior., 5 giorni); pentade 47 (5 giorni); pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 49 (5 giorni); pentade 50 (5 giorni); pentade 51 (5 giorni); pentade 52 (prior., 5 giorni); pentade 53 (4 giorni)</p>
Inanellatore/i e collaboratori	<p>I: Ermanno Borghesi (R)</p> <p>C: Enrico Venturelli</p>

Campiani Pedrina 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	totale
		Prior. (5)	(5)	(5)	Prior. (5)	(5)	Prior. (5)	(5)	(5)	(5)	Prior. (5)	(4)	(54)
Upupa (<i>Upupa epops</i>)		4	2	4	1				2				13
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)				1									1
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)							4	5	7	3			19
Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)										2			2
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)								1		3	2	4	10
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)								1					1
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		4	3	4	3	3	2	5	8	2	1	6	41
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)										1			1
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		1	2	1	1		4	2	5	1	1	1	19
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)										1	1	3	5
Forapaglie (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)								2					2
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)										1			1
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)							1						1
Occhiocotto (<i>Sylvia melanocephala</i>)			1										1
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)								1	1			1	3
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)										1		2	3
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)					1	2	1	7	9	8	1	2	31
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)								1	2	4	3	2	12
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)				1									1
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)		1	1		2	1	1		1	1			8
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)										1			1
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		1	2		1		1	11	4	2	3		25
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)												1	1
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)			1									1	2
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)		3	4	2	1			1	1				12
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		1	2	13	4	5	17	95	88	21	2	5	253
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)							2		2				4
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)						1							1
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)			1	1									2
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)				1									1
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)		7	11	1	5	2	3	2	1		1	2	35
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)			1		1							1	3
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)			1										1
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)		4		2									6
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)				1									1
totale esemplari		26	32	32	20	14	36	134	131	52	15	31	523
totale specie		9	13	12	10	6	10	13	13	15	9	13	35

Stazione: COLLE GALLO



Inquadramento geografico

Località: Colle Gallo
Comune: Gaverina Terme
Provincia: Bergamo
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali
Coordinate geografiche: 45° 46' N; 09° 50' E
Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi Orobie

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico
Quota dell'impianto di cattura: 810 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura: Nord-Est
Quota massima del sistema montuoso: 1100 m s.l.m.
Orientamento del sistema montuoso: Est-Ovest

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare con nocciolo, leccio, robinia, orniello, roverella, carpino nero, carpino bianco e castagno

Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco misto a faggio, castagno, roverella, carpino, orniello e nocciolo alternato a prateria con vegetazione alta 3-5 m e sottoposta a regolazione annuale, con pochi frutti di acero, biancospino, corniolo, crespino, edera, ginepro, mirtillo, rosa selvatica, sambuco e sanguinello

Caratteristiche impianto

Tipologia: Roccolo e passata
Mettratura reti: 150 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta in maniera continuativa da agosto a dicembre dal 1996, da agosto a novembre per l'anno 2000 e nel mese di ottobre per il 2001, 2002 e 2003
Attività nel 2004: Svolta in maniera continuativa da fine settembre a tutto il mese di ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 54 (3 giorni); pentade 55 (prior., 5 giorni); pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 5 giorni); pentade 58 (5 giorni); pentade 59 (prior., 5 giorni); pentade 60 (5 giorni); pentade 61 (5 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Marino Capelli (R)
C: Luigi Poli; Viviana Sabbioni

Colle Gallo 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	54	55	56	57	58	59	60	61	totale
		(3)	(5) Prior.	(5) Prior.	(5) Prior.	(5)	(5) Prior.	(5)	(5)	(38)
Spanviero (<i>Accipiter nisus</i>)				1						1
Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>)			1							1
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)			1		1	2	1	1		6
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)					1	1	1			3
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		1	64	38	21	31	12	13	3	183
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			3							3
Merlo (<i>Turdus merula</i>)				2			1			3
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)				4		1	2			7
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)			1							1
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)			2							2
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)			1	2			2			5
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)					1	2	1	7	10	21
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)				1		1		1	2	5
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)							5			5
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)								1		1
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)				4	3	4	2		3	16
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)			2	2		2	2			8
Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>)				1						1
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)			13	106	30	71	77	41	34	372
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)				3		9	3	1	15	31
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)			2	2	1	1				6
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)						1	1			2
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)							1			1
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)		33	194	487	230	153	288	216	373	1974
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)							3			3
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)			4			4	2	1	1	12
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)				5	15	11	31	22	23	107
totale esemplari		34	288	658	303	294	435	304	464	2780
totale specie		2	12	14	9	15	18	10	9	27

Stazione: CAPANNELLE



Inquadramento geografico	<p>Località: Cava delle Capannelle, nel Parco regionale del fiume Serio</p> <p>Comune: Zanica e Grassobbio</p> <p>Provincia: Bergamo</p> <p>Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali</p> <p>Coordinate geografiche: 45° 37' N; 9° 44' E</p> <p>Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi Orobie</p>
Orografia e caratteristiche del sito	<p>Tipologia del sito: Stazione di pianura</p> <p>Quota dell'impianto di cattura: 195 m s.l.m.</p> <p>Orientamento dell'impianto di cattura: Est - Ovest e Nord - Sud</p> <p>Quota massima del sistema montuoso: 3050 m s.l.m.</p> <p>Orientamento del sistema montuoso: Est -Ovest</p>
Caratteristiche ambientali	<p>Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina</p> <p>Piani altitudinali e vegetazionali: pianura</p> <p>Vegetazione nei pressi delle reti: bosco di pioppo-salice, arbusteto a sambuco e buddleia, rimboschimento recente su cava ripristinata a prato</p>
Caratteristiche impianto	<p>Tipologia: Mist-nets in transetti</p> <p>Metratura reti: 336 m</p>
Periodo attività	<p>Attività pregressa: Svolta regolarmente dal 1994 con denominazione "Polveriera Fiocchi"</p> <p>Attività nel 2004: Svolta regolarmente da agosto ad ottobre</p> <p>Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 5 giorni); pentade 46 (prior., 3 giorni); pentade 47 (5 giorni); pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 50 (3 giorni); pentade 51 (5 giorni); pentade 52 (prior., 5 giorni); pentade 53 (2 giorni); pentade 54 (3 giorno); pentade 55 (prior., 3 giorni); pentade 56 (prior., 3 giorni); pentade 57 (prior., 2 giorni); pentade 58 (3 giorni); pentade 59 (prior., 2 giorni); pentade 60 (4 giorni); pentade 61 (2 giorni);</p>
Inanellatore/i e collaboratori	<p>I: Fabrizio Usubelli (R); Alberto Aguzzi; Gianbattista Cefis; Franco Colnago; Redi Dendena; Roberto Rota</p> <p>C: Walter Baldelli; Roberto Barezzani; Barbara Breviaro; Ottorino Carminati; Antonio Ceruti; Simone Ciocca; Luca Gibellini; Fabrizio Locatelli; Serena Mussi; Alfio Regazzoni</p>

Capannelle 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)																totale (55)
	43 (5) Prior.	46 (3) Prior.	47 (5) Prior.	48 (5) Prior.	50 (3) Prior.	51 (5) Prior.	52 (5) Prior.	53 (2) Prior.	54 (3) Prior.	55 (3) Prior.	56 (3) Prior.	57 (2) Prior.	58 (3) Prior.	59 (2) Prior.	60 (4) Prior.	61 (2) Prior.	
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)				2						1							3
Colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)							1										1
Tortora dal collare (<i>Streptopelia decaocto</i>)		1															1
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	5	5					1										11
Assiolo (<i>Otus scops</i>)	4	1	2	1	2												10
Civetta (<i>Athene noctua</i>)	2	2	2	3			1										10
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)			1					1									2
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	3	6	5	1	1	1	1	3		1							22
Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)						1											1
Upupa (<i>Upupa epops</i>)	3																3
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)	10	1		1	2	1		1									16
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)			1														1
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)	2	1	1		1	2		1	1		1	1				2	13
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)						12	3										15
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		1			7	13	15	3	3	1							43
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)	1	1								1							3
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)									1	1			3	2	4		11
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)										1			1	1	12	3	18
Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)					4	22	24	20	29	59	52	39	66	18	66	24	423
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	22	12	13	5	5	8	1	1									67
Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)								1									1
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)															1		1
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	28	24	10	5	8	15	13	10	6	12	13	7	3	1	2	1	158
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)		1	1		4	11	5	1									23
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)		2	1			1					1						5
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)						1	1										2
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	7	3		3	3	2	1	1	2	1		5	7	6	7	8	56
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)												1					1
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)										4	6		55	7	27	9	108
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)															1		1
Usignolo di fiume (<i>Cettia cetti</i>)	4					1	1			2		1				1	10
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)						1											1
Cannaioia (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		2	1		1			1				2		1			8
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)	2				6	3	4										15
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)	1	1			1												3
Bigliarella (<i>Sylvia curruca</i>)	1				5	1		2									9
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)	1			1	5	5	1										13
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		4	9	12	21	18	10	7		1			1		1		84
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	22	13	11	9	17	42	28	35	10	17	10	12	27	1	30	20	304
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	1			1													2
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	1		1	1	1												4
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)							3		3	12	9	19	28	5	35	19	133
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		2	1	2	13	10	2				2		1				33
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)														1	4	6	11
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)												1	1				2
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)	6	5	7	1	3	6	1	1									30
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	10	55	106	94	197	163	45	20	8	9	2	3					712
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)	11	11	20	1	4	20		11	1	1	1	1	2			3	87
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)			1			3					1					3	8
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	2	2	3			4	1	1	1	1	2	2	1		1		21
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)	6		2														8
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)	1	1					1										3
Gazza (<i>Pica pica</i>)		1	1		1					1					3		7
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	1								1								2
Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)								1									1
Passera oltremontana (<i>Passer domesticus</i>)		1															1
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)	17	2		2	1	2	1		1	1		1			1		29
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)	38	7	4	24	8	26	12	2	6	9	4	5	5	2	9	6	167
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)												2		1	5	1	9
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)	12	1	1			1	2	1	1								19
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)	7	2	2	1	5	2	1	5		2	2	3	3		10	4	49
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	4				2	2	2	2	3								15
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)															3		3
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)															8	9	17
totale esemplari	235	171	207	170	328	401	182	131	77	138	106	105	204	44	228	123	2850
totale specie	31	30	25	20	27	32	28	23	16	21	14	17	15	11	20	17	64

Stazione: LA PASSATA



Inquadramento geografico	<p>Località: La Passata di Zogno</p> <p>Comune: Miragolo S. Marco di Zogno</p> <p>Provincia: Bergamo</p> <p>Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali</p> <p>Coordinate geografiche: 45° 47' N; 9° 43' E</p> <p>Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi Orobie</p>
Orografia e caratteristiche del sito	<p>Tipologia del sito: Valico</p> <p>Quota dell'impianto di cattura: 960 m s.l.m.</p> <p>Orientamento dell'impianto di cattura: Nord-Sud</p> <p>Quota massima del sistema montuoso: 1300 m s.l.m.</p> <p>Orientamento del sistema montuoso: Nord-Sud</p>
Caratteristiche ambientali	<p>Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina</p> <p>Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte montano a bosco misto di latifoglie</p> <p>Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco di latifoglie con nocciolo, carpino nero, orniello, sorbo montano, betulla, con vegetazione maggiore di 5 m, e frutti di sambuco, agrifoglio, edera, biancospino, lantana, rosa canina, agazzino</p>
Caratteristiche impianto	<p>Tipologia: Passata</p> <p>Mettratura reti: 100 m</p>
Periodo attività	<p>Attività progressa: Svolta in maniera continuativa tutto l'anno dal 1995 e in ottobre nel 2003</p> <p>Attività nel 2004: Svolta in maniera continuativa in ottobre</p> <p>Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 55 (prior., 2 giorni); pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 5 giorni); pentade 58 (5 giorni); pentade 59 (prior., 5 giorni); pentade 60 (5 giorni); pentade 61 (5 giorni)</p>
Inanellatore/i e collaboratori	<p>I: Maffeo Schiavi (R); Giuseppe Bogliani; Gianbattista Cefis; Franco Colnago; Bruno Leoni; Violetta Longoni; Ariele Magnani, Diego Rubolini; Walter Serpellini; Fabrizio Usubelli</p> <p>C: Roberto Barezzani; Marco Caccia; Ottorino Carminati; Michelangelo Morganti; Serena Mussi; Luigi Poli; Bassano Riboni; Elisa Riservato; Daniele Rota; Cristina Scalvinoni Rudy Valfiorito</p>

La Passata 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	55	56	57	58	59	60	61	totale
		Prior. (2)	Prior. (5)	Prior. (5)	(5)	Prior. (5)	(5)	(5)	
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)					1		1	1	3
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)					1	1	1		3
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)		1							1
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)		1	3		4		5		13
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)		1	1	1		1	1	1	6
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		13	16	16	16	11	11	2	85
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)							1		1
Merlo (<i>Turdus merula</i>)			6	1	3	2	4	1	17
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)		7	11	8	12	8	8		54
Cannaiola (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		1							1
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		3	3	1				1	8
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)			13	8	2	2	4	1	30
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)				1					1
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)				1	6	3	17	11	38
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)			2	2	2	2	1	1	10
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)			3		8	1		1	13
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)				1	1		3	5	10
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)		4	2	2	2	5	3	2	20
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)			1				1		2
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)		6	95	56	65	59	59	38	378
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)			5	1	17	42	20	17	102
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)				1			1		2
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)					1		3	1	5
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)					1				1
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)		50	283	171	85	52	84	72	797
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)			10	2	5	2			19
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		1					1		2
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)				41	30	140	111	56	378
totale esemplari		88	454	314	262	331	340	211	2000
totale specie		11	15	17	19	15	21	16	28

Stazione: ROCCOLI ZOIS



Inquadramento geografico

Località: Roccoli Zois

Comuni: Sant'Omobono Imagna - Corna Imagna - Brembilla - Bello

Provincia: Bergamo

Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali

Coordinate geografiche: 45° 49' N; 9° 33' E

Valle e/o gruppo montuoso: Prealpi Orobiche o Bergamasche

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico

Quota dell'impianto di cattura: 850 m s.l.m.

Orientamento dell'impianto di cattura: Nord - Sud

Quota massima del sistema montuoso: 1875 m s.l.m.

Orientamento del sistema montuoso: Nord Ovest - Sud Est

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina

Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare-montano con bosco misto di latifoglie

Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco misto di latifoglie con dominanza di agrifoglio e presenza di carpino nero, carpino bianco, nocciolo, aceri, sorbo, castagno, orniello, cerro, rovere, biancospino, faggio, tiglio, sambuco, corniolo e rosa selvatica

Caratteristiche impianto

Tipologia: Roccoli e passata

Mettratura reti: 129 - 156 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta in maniera saltuaria in settembre-novembre 2001 e regolare ogni pentade in settembre e ottobre 2002 e 2003

Attività nel 2004: Svolta regolarmente da fine agosto a ottobre

Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 50 (5 giorni); pentade 53 (2 giorno); pentade 55 (prior., 2 giorno); pentade 56 (prior., 1 giorno); pentade 57 (prior., 3 giorni); pentade 58 (2 giorni); pentade 60 (2 giorni); pentade 61 (1 giorno)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Roberto Rota (R)

C: Edvige Ghisalberti; Claudia Fucili; Alberto Lebola; Michele Rota; Alessandra Trotti

Roccoli Zois 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	48	50	53	55	56	57	58	60	61	totale
		Prior. (5)	(5)	(2)	Prior. (2)	Prior. (1)	Prior. (3)	(2)	(2)	(1)	(23)
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)			1								1
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)							1				1
Allocco (<i>Strix aluco</i>)			1								1
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)			1								1
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)					1						1
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)										1	1
Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)		10	21	11	22	7	34	18	18	1	142
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		1	3								4
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		4	1			1	1	1	2	2	12
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)			1	1	2	1	5	3	6	1	20
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)										2	2
Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>)						1					1
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		2	8		1		1				12
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)			3	3			6	2	2		16
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		1			1		11	1	3		17
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		4	4		1						9
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)					1		1	2	5	3	12
Fiorellino (<i>Regulus ignicapillus</i>)					1		1	1			3
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		20	62	5	1						88
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)				1			4	2	1	1	9
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		2									2
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)		1	4	3	2	3	5	1	2		21
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)		1					2	2			5
Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>)							2				2
Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>)		1		1							2
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)			2	2	3	2	13	9	9	10	50
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)								2		2	4
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)			1								1
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)					2	7	6		1	3	19
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)		1					2	1	9	5	18
totale esemplari		48	113	27	38	22	95	45	58	31	477
totale specie		12	14	8	12	7	16	13	11	11	30

Stazione: CASCINA LODOLETTA



Inquadramento geografico

Località: Pian di Spagna
Comune: Gera Lario
Provincia: Como
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali
Coordinate geografiche: 46° 10' N; 9° 23' E
Valle e/o gruppo montuoso: Valtellina-Valchiavenna

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Stazione di fondovalle
Quota dell'impianto di cattura: 200 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura:
Quota media del fondovalle: 250 m s.l.m.
Orientamento del sistema vallivo: Valtellina (Est - Ovest); Valchiavenna (Nord - Sud)

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare con ambiente ripariale a salice e ontano
Vegetazione nei pressi delle reti: Ambiente umido di fondovalle a salici e ontani, con vegetazione, alta da 2 a 5 m, sottoposta a regolazione annuale e in prossimità di uno specchio d'acqua, con molti frutti di sambuco e frangola

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti
Mettratura reti: 102 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta regolarmente da agosto a ottobre
Attività nel 2004: Svolta in maniera continuativa da agosto a fine ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 4 giorni); pentade 44 (2 giorni); pentade 45 (prior., 2 giorni); pentade 46 (prior., 5 giorni); pentade 47 (3 giorni); pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 49 (3 giorni); pentade 50 (2 giorni); pentade 51 (1 giorno); pentade 52 (prior., 2 giorni); pentade 53 (2 giorni); pentade 54 (1 giorno); pentade 55 (prior., 2 giorni); pentade 56 (prior., 1 giorno); pentade 57 (prior., 2 giorni); pentade 58 (2 giorni); pentade 59 (prior., 1 giorno); pentade 60 (1 giorno); pentade 61 (1 giorno)
I: Walter Corti (R)

Inanellatore/i e collaboratori

C: Roberto Barezzani; Gaia Bazzi; Lionello Bazzi; Alessandro Corgatelli; Francesco Econimo; Franca Fibioli; Luciano Mingarelli; Giuliana Pirota; Denise Schneider

Cascina Lodoletta 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	totale
		(4) Prior.	(2)	(2)	(5) Prior.	(3)	(5) Prior.	(3)	(2)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)
Volturno (<i>Porzana porzana</i>)		1																			1
Assiolo (<i>Otus scops</i>)					1																1
Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)		3	1														1				5
Upupa (<i>Upupa epops</i>)		3																			3
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)		1		1	5	1	1	1	1	2		1									14
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)			1																		1
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)								1													1
Topino (<i>Riparia riparia</i>)								1													1
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)			2						1					1		1					5
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)												2		1							3
Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>)		1		1																	2
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)				1	1		1									1					4
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)															1	3	2	1	2		9
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)									4	1	3	9		2	4	3	12	3	3	1	45
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)		3		3	3	3	1	1		1											15
Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)				1	1	2	1	1	3	2		1									12
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)		18	8	4	6	4	5	4	3	6	3	2	3	1	2	9	1				79
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)					1				1												2
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)													1	4							5
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		7	2				1				1			1	1	1			1	1	16
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)														1			9				10
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)					2					1											3
Forapaglie (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)		2																			2
Cannaiola verdo gnola (<i>Acrocephalus palustris</i>)					1					1	2	1									5
Cannaiola (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		6		6	13	7	4	4	7	1	13	31				1	1				94
Cannareccione (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)		2	4	2	1	1	1		1												12
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)						1			1												2
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)		1		1				1													3
Bigia padovana (<i>Sylvia nisoria</i>)		1																			1
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)			2		2	1		3	1	1		1				1					12
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)		1	2						2	1	1	1									8
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)			2	7	31	7	13	14	39	15	11	6	1	2		1	2		1		152
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		14	1	1	2		4	3	13	6	18	15	3	8	3	6	5	4		1	107
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)												1	2	1	2	9	9	2	7	2	35
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)								2	3							1					6
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)		1	1	1	2			1													6
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		1			1	7	1	14	8	4											36
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)								1							1	4	5	2	1	1	15
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)			1				1	1						1			2			3	9
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)							2														2
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)		2			1	2	1	1		1	1	1				1					11
Sturno (<i>Sturnus vulgaris</i>)		16	12		1		1										1				31
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)		17	3	1	5	2	4	2	6			9	9	4	1	13	11		1		88
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)		7	4	1	18	1	9	1	1		2	3	1		1		3	3	7	2	64
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)																4	5	3	6	20	38
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)																				1	1
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)		2			1		1														4
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)															4					3	7
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)																				1	1
Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)					1			1													2
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)		1	2	2										1			3	2	5	9	25
totale esemplari		111	48	33	100	39	52	58	95	43	55	84	20	28	20	59	72	20	39	40	1016
totale specie		23	16	15	22	13	18	20	17	14	10	15	7	13	10	16	16	8	13	9	51

Stazione: ISOLINO



Inquadramento geografico

Località: Isolino

Comune: Verbania

Provincia: Verbania

Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi centrali

Coordinate geografiche: 45° 56' N; 8° 30' E

Valle e/o gruppo montuoso: Lago Maggiore

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Stazione di fondovalle

Quota dell'impianto di cattura: 195 m s.l.m.

Orientamento dell'impianto di cattura: Nord Ovest-Sud Est

Quota massima del sistema montuoso:

Orientamento del sistema montuoso:

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione centrale (clima continentale)

Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare con saliceto e pioppeto ripariale e area prativa destinata a campeggio

Vegetazione nei pressi delle reti: Ambiente umido di fondovalle a fragmiteto, con vegetazione alta 3-5 m, non sottoposta a regolazione e in prossimità di uno specchio d'acqua, assenza di frutti

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti

Metatura reti: 300 m

Periodo attività

Attività progressa: Svolta regolarmente in febbraio-marzo e settembre-ottobre dal 1993 al 1998. Nel 2001 e 2002 svolta in modo continuativo in agosto-settembre e in modo meno regolare in ottobre, nel 2003 in modo continuativo da agosto a ottobre

Attività nel 2004: Svolta in modo continuativo da agosto a ottobre

Pentadi coperte e n° di giorni: Pentade 44 (5 giorni); pentade 45 (5 giorni); pentade 46 (prior., 5 giorni); pentade 47 (5 giorni); pentade 48 (prior., 5 giorni); pentade 49 (5 giorni); pentade 50 (5 giorni); pentade 51 (5 giorni); pentade 52 (prior., 5 giorni); pentade 53 (5 giorni); pentade 54 (5 giorni); pentade 55 (prior., 5 giorni); pentade 56 (prior., 5 giorni); pentade 57 (prior., 5 giorni); pentade 58 (5 giorni); pentade 59 (prior., 5 giorni); pentade 60 (5 giorni); pentade 61 (4 giorni);

Inanellatore/i e collaboratori

I: Marco Bandini (R); Daniele Accantelli; Giuseppe La Gioia; Giovanni Liberini; Ariele Magnani Dario Piacentini

C: Chiara Albero; Carmen Forcellini; Marzia Germinetti; Caterina Mervic; Mariella Nicastro; Claudio Orlandi; Renato Orlandi; Roberta Talamona; Massimo Villani

Isolino 2004

ALPI CENTRALI

Specie	Pentade (giornate di attività)																	totale (89)	
	44 (5)	45 (5)	46 (5)	47 (5)	48 (5)	49 (5)	50 (5)	51 (5)	52 (5)	53 (5)	54 (5)	55 (5)	56 (5)	57 (5)	58 (5)	59 (5)	60 (5)		61 (4)
Tarabusino (<i>Ixobrychus minutus</i>)				1															1
Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)														1					1
Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)																1			1
Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)	5	3	1	2	2	2	2	2	1	2		2	1	2	1		1	1	30
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)			1		1					1									3
Topino (<i>Riparia riparia</i>)								1											1
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)								6	7	4	3								20
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)									2										2
Spioncello (<i>Anthus spinoletta</i>)								1							1				2
Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)					5	8		3	4										20
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)	4							1			1			1					7
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)												2	3		2		5	2	14
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)											1	7	20	5	27	1	5	1	67
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)	1					1	4	4	3	11	17	32	37	19	50	6	45	12	242
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)					1														1
Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)	1	2		2		1	1	1			1								9
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)														1					1
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	1	1	1	2	3	1	2	1	2	3		3	2	1	2				25
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)			2	2	3	7	11	2	1										28
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)																	3		3
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	1	3			1	1	2	1			1	3	1	1					15
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)															1				1
Usignolo di fiume (<i>Cettia cetti</i>)	4	1	1	4	3	2	14	7	4	7	5	11	4	3	3		2		75
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)	1		1			1	4	2		2	1	1	4	2					19
Salciaiola (<i>Locustella luscinioides</i>)											1								1
Forapaglie (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	2	5		3			6	3	1						1				21
Cannaiola verdognola (<i>Acrocephalus palustris</i>)	1	2	1				1	1											6
Cannaiola (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	186	68	46	50	43	40	127	56	20	51	9	33	29	31	22	3	1	1	816
Cannareccione (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	3						1				1								5
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)	1					2	4	5	1		1								14
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)	3	1	1		1	1													7
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)		2			3	8	4	5		2	1	1							26
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)	1		1	1	1	1	6	5		1		1							18
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		5		3	1	5	7	5	2	1	1	1			2				33
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	3	4	4		2	6	11	14	14	11	15	13	7	7	2	1	10	2	126
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)	1			1			1	1	4	17	24	43	168	156	224	88	156	56	940
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	9	6	1	2	6	19	39	29	10	9	5	10	13	4	5	1			168
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)																	1	1	2
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)	3	1	2		1	4													11
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	1	6			2	8	42	6	1				1						67
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)					4	1			2	3	2				2				14
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)																	3		3
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)	8	2	1		2	6	7	4	1	4	4	7	6	3	7	3	8	3	76
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	8	1	1		1	1		5	2	2	4	8	1	1	3		1		39
Rampichino (<i>Certhia brachydactyla</i>)												1	1						2
Pendolino (<i>Remiz pendulinus</i>)												1	7	12	44	16	68	11	159
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)	2	3	1	1	3	7			1										18
Storno (<i>Stumus vulgaris</i>)			5	3	5				2	4	3	4	8	2			3	6	45
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)	26	15	7	31	10	14	4	1	2	5	6	7	2	1	1		1	1	134
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)	1	7	2	2	3	2					1	2	4	2		1			27
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)			1			3			1	1					1				7
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)	1	2	5	1		1													10
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)				1	1							1	2						5
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	1					1	1					1							4
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	2	1		1						2		13	58	81	80	21	105	32	396
totale esemplari	281	141	86	113	108	154	301	176	87	142	106	208	379	336	481	142	418	129	3788
totale specie	28	22	21	19	25	28	23	29	22	21	22	25	22	21	21	11	17	13	55

Stazione: PALUDE DI SAN GENUARIO



Inquadramento geografico	<p>Località: Palude di San Genuario</p> <p>Comune: Fontanetto PO</p> <p>Provincia: Vercelli</p> <p>Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi occidentali</p> <p>Coordinate geografiche: 45°13'N 8°10'E</p> <p>Valle e/o gruppo montuoso:</p>
Orografia e caratteristiche del sito	<p>Tipologia del sito: Stazione di fondovalle</p> <p>Quota dell'impianto di cattura: 147 m s.l.m.</p> <p>Orientamento dell'impianto di cattura: NNW-SSE</p> <p>Quota massima del sistema montuoso:</p> <p>Orientamento del sistema montuoso:</p>
Caratteristiche ambientali	<p>Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina</p> <p>Piani altitudinali e vegetazionali: Pianura</p> <p>Vegetazione nei pressi delle reti: Ambiente umido di fondovalle principalmente a fragmiteto alto 2-3 m e secondariamente a giuncheto, cariceto e torbiera; vegetazione sottoposta a regolazione annuale, presenza di acqua stagnante e di molti frutti (more di rovo)</p>
Caratteristiche impianto	<p>Tipologia: Mist-nets in transetti</p> <p>Mettratura reti: 324 m</p>
Periodo attività	<p>Attività progressa: Svolta con cadenza mensile in maniera irregolare dal 1995 al 2000, mentre dal 2001 al luglio 2004 in modo regolare</p> <p>Attività nel 2004: Svolta in maniera regolare ogni decade dalla prima di agosto alla prima di ottobre</p> <p>Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 2 giorni); Pentade 46 (prior., 2 giorni); pentade 47 (1 giorno); pentade 48 (prior., 3 giorni); pentade 49 (2 giorni); pentade 50 (2 giorni); pentade 51 (1 giorno); pentade 52 (prior., 3 giorni); pentade 54 (2 giorni); pentade 55 (prior., 1 giorno); pentade 56 (prior., 1 giorno); pentade 57 (prior., 1 giorno);</p>
Inanellatore/i e collaboratori	<p>I: Sergio Fasano (R); Marco Pavia (R); Giovanni Boano; Paolo Bonazzi; Violetta Longoni; Diego Rubolini; Gabriele Vaschetti</p> <p>C: Giovanni Albarella; Marta Azzolin; Massimo Bocca; Mario Cozzo; Dario Di Noia; Chiara Elia; Matteo Gagliardone; Giorgio Gertosio; Mauro Giammarino; Ousman Oudrago; Sandro Ranghino; Giovanni Soldato; Nicola Scatassi; Simone Tozzi; Enrico Vigliani; Silvano Zuarini</p>

Palude di San Genuario 2004

ALPI OCCIDENTALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	43	46	47	48	49	50	51	52	54	55	56	57	totale
		(2) Prior.	(2) Prior.	(1) Prior.	(3) Prior.	(2)	(2)	(1)	(3) Prior.	(2)	(1) Prior.	(1) Prior.	(1) Prior.	(1) Prior.
Tarabusino (<i>Ixobrychus minutus</i>)		16	3	2	7	3	1	1						33
Nitticora (<i>Nycticorax nycticorax</i>)									2					2
Tuffetto (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)											1			1
Alzavola (<i>Anas crecca</i>)									1	1				2
Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)		1	1						1					3
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)				1					1					2
Lodolaio (<i>Falco subbuteo</i>)												1		1
Fagiano comune (<i>Phasianus colchicus</i>)							1							1
Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)							1		1					2
Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)									8	1	1			10
Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)								2	5	1				8
Piro piro boschereccio (<i>Tringa glareola</i>)									2					2
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)						1								1
Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)		7	7	2	8	2		1		4	2			33
Gruccione (<i>Merops apiaster</i>)			4											4
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)			2		1	1	1	1	2					8
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)							1							1
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)					2		1							3
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)			1	1							1			3
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)											1			1
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)									2	3	1	3	3	12
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)		15	13	6	12	6	5	1	1	1				60
Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)						1				1				2
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			1						1		2	1	3	8
Merlo (<i>Turdus merula</i>)			3		2	1	1		8	2		1	3	21
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)													2	2
Usignolo di fiume (<i>Cettia cetti</i>)		9	9	1	9	2	5		8	4	4		5	56
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)											1			1
Locustella fluviatile (<i>Locustella fluviatilis</i>)			1											1
Salciaiola (<i>Locustella luscinioides</i>)					1		1							2
Forapaglie castagnolo (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)									1					1
Forapaglie (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)		6	5	4	9	7	2	4	2	6	1			46
Cannaiola verdognola (<i>Acrocephalus palustris</i>)		4	1	2	2	3			1					13
Cannaiola (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		40	26	8	20	13	12	13	11	3	3	4	7	160
Cannareccione (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)		7	7	2	10	4	1	1						32
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)		4	1		1	4								10
Sterpazzolina (<i>Sylvia cantillans</i>)						1	1	1						3
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)					1	1	3	1	2					8
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)					1	1	1	2						5
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		1	2		8	7	5	5	4					32
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		3	6	7	11	6	9	6	30	17	7	1	7	110
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)						1								1
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)									1	14	3	26	23	67
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)			1		1		3	3	13	1	3	1		26
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)								1						1
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)			1			4	2		8				1	16
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)									10		1	1		12
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)			1		2	2	1	3	7	2	2	1	7	28
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)		1	4	2		1	1	2	3	1				15
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)		2	3		5			1	1					12
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)			1											1
Gazza (<i>Pica pica</i>)					1									1
Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)		75	60	6	11	21	117	19	5	46	6	14	2	382
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)		2												2
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)		40	14	3	1	14	1	1	3	6	8	1	8	100
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)													1	1
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)			1		2	1	4				1			9
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)												3		3
totale esemplari		233	185	47	128	108	181	69	145	114	47	58	72	1383
totale specie		17	27	14	24	25	25	20	30	18	19	13	13	58

Stazione: LAGO DI CANDIA



Inquadramento geografico

Località: Parco naturale provinciale del Lago di Candia
Comune: Vische
Provincia: Torino
Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi occidentali
Coordinate geografiche: 45° 23' N; 8° 01' E
Valle e/o gruppo montuoso:

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Stazione di fondovalle
Quota dell'impianto di cattura: 230 m s.l.m.
Orientamento dell'impianto di cattura:
Quota massima del sistema montuoso:
Orientamento del sistema montuoso:

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia prealpina
Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte collinare con fragmiteto e vegetazione igrofila
Vegetazione nei pressi delle reti: Ambiente lacustre di fondovalle con saliceto, ontaneto e vegetazione riparia alta fino a 8 m (con sottobosco a sambuco), e ampia fascia circumlacustre a fragmiteto

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti
Metatura reti: 192 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta in maniera regolare con cadenza quindicinale dal 1998
Attività nel 2004: Svolta regolarmente con cadenza quindicinale in agosto e settembre e ogni pentade in ottobre
Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 1 giorno); Pentade 44 (1 giorno); pentade 46 (prior., 2 giorni); pentade 48 (prior., 1 giorno); pentade 50 (2 giorni); pentade 52 (prior., 1 giorno); pentade 53 (1 giorno); pentade 55 (prior., 1 giorno); pentade 56 (prior., 1 giorno); pentade 57 (prior., 3 giorni); pentade 58 (3 giorni); pentade 59 (prior., 3 giorni); pentade 60 (3 giorni); pentade 61 (2 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Luca Biddau (R)
C: Luca Iorio; Davide Blanchietti; Emanuela Garino; Silvia Grosso; Guido Cattaneo; M. Inalba; R. Patrignani; Roberto Quarise; V. Rao; Cristina Terzolo; Luciano Ughetto; Enrico Vigliani; Mario Zucca

Lago di Candia 2004

ALPI OCCIDENTALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	43	44	46	48	50	52	53	55	56	57	58	59	60	61	totale
		(1) Prior.	(1)	(2) Prior.	(1) Prior.	(2)	(1) Prior.	(1) Prior.	(1) Prior.	(1) Prior.	(1) Prior.	(3) Prior.	(3) Prior.	(3) Prior.	(3)	(2)
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)									3							3
Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>)						1										1
Tortora dal collare (<i>Streptopelia decaocto</i>)														3		3
Civetta (<i>Athene noctua</i>)			1													1
Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>)			1								1					2
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)						1										1
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)			1	1							1		2			5
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)		1		2		1			1		1		2			8
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)				1		2										3
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)											1					1
Cutrettola (<i>Motacilla flava</i>)										1		1				2
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)							1	2		3	2	6	10	7	4	35
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)				8						2	1	12	13	6	7	49
Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)		1		1		6	7	7	12	11	40	23	30	32	12	182
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)		1	1	2	3	3	1	1								12
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)						2										2
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)				3	1	2					2					8
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		1	2	3	4				3	1	1	5	3	4	6	33
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)										4	3	13	9			29
Usignolo di fiume (<i>Cettia cetti</i>)						1	2		2		2	1	2			10
Forapaglie castagnolo (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)												1				1
Forapaglie (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)						1										1
Cannaiola verdognola (<i>Acrocephalus palustris</i>)		38	24	3	8	9	1	1		1						85
Cannaiola (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		1	1	3		11	1				2	2		1	2	24
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)		1				1										2
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)				1												1
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)				5		5	1	2								13
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)				1		1										2
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)			1	2	1	6	2		1							13
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		14	10	18	5	16	6	10	14	4	10	16	16	4	11	154
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)				1												1
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)			1													1
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)						1		2	9	1	74	40	33	45	11	216
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)						2	1	1								4
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)														3	9	12
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)			1													1
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)			1	2		5	5	1			2					16
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)						6	4	4			7	10	6		6	43
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)			2			3	1		5		2	1	4	6	4	28
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)		4	2	6	2	3		3	6	1	5	12	7	7	3	61
Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>)						1		1		1			1	1		5
Rampichino (<i>Certhia brachydactyla</i>)						1										1
Pendolino (<i>Remiz pendulinus</i>)											2		1	1		4
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)						1										1
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)				1		1										2
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)								1					2			3
Gazza (<i>Pica pica</i>)				4												4
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)					1	3	1				10	2	6		4	27
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)										1		3	3	4	2	13
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)				2												2
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)				4		3										7
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)									5	1		1		2	2	11
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)			3				2	2	1		11	26	118	172	94	429
totale esemplari		62	50	76	25	99	36	38	62	32	180	175	268	298	177	1578
totale specie		9	13	24	8	29	15	14	12	13	21	18	19	16	15	53

Stazione: LA VEDETTA



Inquadramento geografico

Località: La Vedetta RNO (Riserva Naturale Orientata) della Vauda

Comune: Vauda Canavese

Provincia: Torino

Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi occidentali

Coordinate geografiche: 45° 15' N; 07° 35' E

Valle e/o gruppo montuoso: Valli di Lanzo

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Stazione di fondovalle

Quota dell'impianto di cattura: 410 m s.l.m.

Orientamento dell'impianto di cattura: In parte Nord Est - Sud Ovest e in parte Sud Est - Nord Ovest

Quota massima del sistema montuoso: 2900 m s.l.m.

Orientamento del sistema montuoso: Est - Ovest

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia pedemontana

Piani altitudinali e vegetazionali: Pianura

Vegetazione nei pressi delle reti: Ampie aree aperte a *Molinia caerulea* e *Calluna Vulgaris*, con macchie sparse di vegetazione pioniera (betulla, pioppo tremulo, corniolo) in ricrescita e boschetti isolati di *Robinia pseudoacacia*. Versante orientale dell'altopiano Canavese con formazioni arboree a quercu-carpineto colonizzate da castagno

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti

Metraglia reti: 168 - 180 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta saltuariamente con denominazione RNO Vauda

Attività nel 2004: Svolta ogni decade in agosto a settembre e ogni pentade in ottobre

Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 43 (prior., 1 giorno); pentade 46 (prior., 2 giorni); pentade 48 (prior., 2 giorni); pentade 52 (prior., 2 giorni); pentade 55 (prior., 2 giorni); pentade 56 (prior., 2 giorni); pentade 57 (prior., 1 giorno); pentade 58 (1 giorno); pentade 59 (prior., 2 giorni);

Inanellatore/i e collaboratori

I: Gian Abele Bonicelli (R); Valentina Mangini (R); Bruno Frache (R); Gianfranco Ribetto (R); Domenico Rosselli (R); Giuseppe Roux Poignant (R); Alberto Tamietti (R)

C: Eleonora Bertolo (R); Francesca Lupo; Andrea Maccioni; Claudia Metti; Paolo Ranotto; Enrico Vigliani; Silvano Zuarini

La Vedetta 2004

ALPI OCCIDENTALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	43	46	48	52	55	56	57	58	59	totale
		(1) Prior.	(2) Prior.	(2) Prior.	(2) Prior.	(2) Prior.	(2) Prior.	(1) Prior.	(1) Prior.	(2) Prior.	(15)
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)						1					1
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)				1			2		1		4
Picchio rosso maggiore (<i>Dendrocopos major</i>)							2	1			3
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)				1	2						3
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)							2			4	6
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)							2	1	5	5	13
Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)		3	3	1	7	3	31	8	10	27	93
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)			3								3
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)					2	2	5				9
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)			1					3	1		5
Merlo (<i>Turdus merula</i>)			2								2
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)							2	1	9	1	13
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)				1							1
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)		8	1	2							11
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)		1		1	4						6
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)			1	2				1			4
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		23	21	15	13	3	2	4		1	82
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)				1			1				2
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		3		4	3	27	70	21	21	16	165
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)				2	8	3	7				20
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)										2	2
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)			1		5		2				8
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)		7		7	9	7	7		3	15	55
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)		1			4	1	2	3	2	3	16
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)		8	1	7	18	9	13	5	1	3	65
Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>)		2	1	4	3	2	1			2	15
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)		1	1	1			3	2			8
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)										3	3
Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinella</i>)		1	2	1		4	7	2	3	5	25
totale esemplari		58	38	49	78	64	161	52	56	87	643
totale specie		11	12	14	13	12	18	12	10	13	29

Stazione: COLLE DELL'ORTIGA



Inquadramento geografico

Località: Colle dell'Ortiga

Comune: Demonte

Provincia: Cuneo

Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi occidentali

Coordinate geografiche: 44° 21' N; 7° 17' E

Valle e/o gruppo montuoso: Val Stura Demonte e Val Grana

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Valico

Quota dell'impianto di cattura: 1774 m s.l.m.

Orientamento dell'impianto di cattura: Est-Ovest

Quota massima del sistema montuoso: 3500 m s.l.m.

Orientamento del sistema montuoso: Est-Ovest

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione meridionale (clima atlantico) - Fascia alpina

Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte subalpino con sorbo, abete rosso, larice, pino mugo ed ontano verde

Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco di conifere a pino mugo alternato a pascolo, con vegetazione alta fino a 3 m e non sottoposta a regolazione, presenza di piccolo specchio d'acqua, assenza di frutti

Caratteristiche impianto

Tipologia: Passata

Metraglia reti: 144 m

Periodo attività

Attività progressa: Svolta saltuariamente da agosto a ottobre dal 1997, in maniera regolare dal 1999 e continuativa nella seconda metà di ottobre del 2001-2002 e nella prima metà di ottobre del 2003

Attività nel 2004: Svolta in maniera continuativa nell'ultima decade di ottobre

Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 59 (prior., 2 giorni); pentade 60 (5 giorni);

Inanellatore/i e collaboratori

I: Sergio Fasano (R)

C: Luca Amistadi; Alessandro Qualich; Simone Tozzi

Colle dell'Ortiga 2004

ALPI OCCIDENTALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	59	60	totale
		Prior. (2)	(5)	(7)
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)			2	2
Civetta capogrosso (<i>Aegolius funereus</i>)			1	1
Pispola (<i>Anthus pratensis</i>)			1	1
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)		1	1	2
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)		1	4	5
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		18	52	70
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)			2	2
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		1	1	2
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)		9	11	20
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		3	15	18
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)		8	10	18
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)		1		1
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)		14	3	17
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		7	2	9
Cincia dal ciuffo (<i>Parus cristatus</i>)		2	2	4
Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>)		4		4
Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)		5		5
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)		19	37	56
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)		4	1	5
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)		2		2
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)		38	20	58
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)			1	1
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)		1		1
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)			1	1
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)			1	1
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)		3	1	4
totale esemplari		141	169	310
totale specie		19	21	26

Stazione: PRATI DEL VALLONE



Inquadramento geografico

Località: Prati del Vallone

Comune: Pietraporzio

Provincia: Cuneo

Ubicazione "longitudinale" nell'arco alpino: Alpi Occidentali

Coordinate geografiche: 44° 20' N; 07° 02' E

Valle e/o gruppo montuoso: Alpi Marittime

Orografia e caratteristiche del sito

Tipologia del sito: Stazione di fondovalle

Quota dell'impianto di cattura: 1700 m s.l.m.

Orientamento dell'impianto di cattura:

Quota massima del sistema montuoso: 3000 m s.l.m.

Orientamento del sistema montuoso: Nord Ovest-Sud Est

Caratteristiche ambientali

Ubicazione "latitudinale": Porzione centrale (clima continentale)

Piani altitudinali e vegetazionali: Orizzonte subalpino a larice

Vegetazione nei pressi delle reti: Ambiente sommitale a lariceto alternato a pascolo e ad arbusteto a sorbo, con vegetazione alta 1-5 m e non sottoposta a regolazione, in prossimità di un rivo, con pochi frutti di mirtillo, sorbo, lampone e crespino

Caratteristiche impianto

Tipologia: Mist-nets in transetti

Metratura reti: 159 m

Periodo attività

Attività pregressa: Svolta in maniera saltuaria da agosto a ottobre dal 1982 e più regolarmente dal 1998

Attività nel 2004: Svolta saltuariamente da fine agosto a fine ottobre

Pentadi coperte e (n° di giorni): Pentade 46 (prior., 3 giorni); pentade 48 (prior., 3 giorni); pentade 54 (2 giorni); pentade 61 (2 giorni)

Inanellatore/i e collaboratori

I: Gerolamo Ferro (R); Bruno Tibaldi

C: Enrico Caprio; Giacomo Casanova; Valerio Corti; Mario Cozzo; Luca Di Murro; Valentina Mariniello; Domenico Marinetto; Elena Nicosia; Claudia Rossato; Vittorio Strobino; Giacomo Tessiere; Stefania Varsalona; Lorenza Vaschetti; Sara Vazzola;

Prati del Vallone 2004

ALPI OCCIDENTALI

Specie	Pentade (giornate di attività)	46	48	54	61	totale
		(3) Prior.	(3) Prior.	(2)	(2)	(10)
Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>)		1				1
Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>)		1				1
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)					1	1
Civetta capogrosso (<i>Aegolius funereus</i>)			1		1	2
Torcicollo (<i>Jinx torquilla</i>)		2	2			4
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)		7	6	1		14
Spioncello (<i>Anthus spinoletta</i>)					1	1
Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>)		5	4			9
Merlo acquaiolo (<i>Cinclus cinclus</i>)		4		1		5
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)			1	2		3
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)		5	10	6	19	40
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)		16	8	44	55	123
Codirosso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			1	2		3
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)		5	8			13
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)		9				9
Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>)		1				1
Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)		1				1
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		2		2	6	10
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)			2		8	10
Forapaglie macchiettato (<i>Locustella naevia</i>)		1				1
Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>)		1				1
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)		1	1			2
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)		7	8			15
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)		1	1	1		3
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)		2	1			3
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)		17	4	4	1	26
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		3	2	1		6
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		3	19			22
Cincia mora (<i>Parus ater</i>)		1	3	4	2	10
Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>)					2	2
Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>)		2	1	5	2	10
Rampichino alpestre (<i>Certhia familiaris</i>)		1	1			2
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)		1				1
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)		2	1			3
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)		2			3	5
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)		1	1			2
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)		4	2	2		8
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)		1				1
Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinella</i>)		1				1
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)		27	9	6		42
totale esemplari		138	97	81	101	417
totale specie		33	24	14	12	40